

## ジェブタナ（カバジタキセル）について

平成 26 年 9 月 16 日  
大阪府泌尿器科審査委員一同

平成 26 年 9 月に発売のジェブタナ（カバジタキセル）について審査上の注意点を公表します。

効能・効果： 前立腺癌

用法・用量： プレドニゾロンとの併用においてジェブタナ 25mg/m<sup>2</sup>を投与  
3 週間間隔

- ①記載要領にはありませんが、体重・身長・体表面積を記載して下さい。
- ②廃棄量が多い場合は、コメントを付けて下さい。

使用上の注意： 2 重要な基本的注意（添付文書・治験データより）

(1) 重篤な骨髄抑制が高頻度にあられるので…

- ①好中球の減少とこれに対する G-CSF の投与が予想されます。  
好中球の推移と G-CSF の投与日を記載して下さい。

その他： ①添付文書・適正使用ガイド・治験データをよく読んでご使用下さい。  
②日本泌尿器科学会のホームページ→会員へのお知らせ→カバジタキセルの留意事項をご覧下さい。

症例によっては型通りいかない場合も考えられます。この場合、症状・詳記を記載して下さい。内容によって各審査委員が判断いたします。

去勢抵抗性前立腺癌の診断

内外の診断基準を用いて行って下さい。

尚、発売後の EBM によっては変更になることもあります。その節は改めて公表いたします。